

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Bayer Hungária Kft.** (1117 Budapest, Dombóvári út 26.) által képviselt **Bayer AG** (Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen, Németország) ügyfélnek a **Teldor 500 SC gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a **Teldor 500 SC gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 6300/2159-1/2020. **NÉBIH** számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Kiszерelés, csomagolás:

- 6.1. Kiszерelés térfogata/tömege: 10 ml; 100ml; 1 liter, 200 liter, 1000 liter
6.2. Csomagolószer anyaga: HDPE

II. Az engedélyokirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

8. Forgalmazási kategória:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 10 ml; 100 ml: | III. |
| 1 liter, 200 liter, 1000 liter: | II. |

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az engedély módosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2025. november 24.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(719/2025)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.

☎ +36 (30) 216-6303

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. Engedélyokirat száma: **6300/2159-1/2020. NÉBIH**
- 1.2. Növényvédő szer neve: **Teldor 500 SC**
- 1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2030. december 31.**
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: **Bayer AG**
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen,
Németország
- 1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Bayer Hungária Kft.**
1117 Budapest, Dombóvári út 26.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. Növényvédő szer gyártója: **Bayer AG**
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen,
Németország
- 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: **gombaölő permetezőszer**
- 2.3. Növényvédő szer formulációja: **szuszpenzió koncentrátum (SC)**
- 2.4. Növényvédő szer összetétele:
- 2.4.1. hatóanyag ISO név fenhexamid
CAS szám 126833-17-8
IUPAC név N-(2,3-diklór-4-hidroxifenil)-1-metilciklohexán-1-karboxamid
tisztá hatóanyag részaránya **500 g/L**

3. Minőségi követelmények:

- 3.1. Hatóanyag tartalom
- 3.1.1. fenhexamid (HPLC-UV) $42,4 \pm 2,1\%$ (m/m)
- 3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az SC formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: világos barna színű, kissé aromás illatú
szuszpenzió

pH (1%-os szuszpenzió): 6,9

relatív sűrűség: 1,18

felületi feszültség (25°C): 41 mN/m

Nedves szita maradék (75µm): < 0,01%

Tartós habképződés (0,8% szuszpenzió, 1 perc): 21 ml

Kiönthetőségi maradék: 3%

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				készítmény (l/ha)	víz (l/ha)	
szőlő (csemege)	botritiszes betegség (szürkepenész)	3	10	0,75-1,0	600-1000	virágzás kezdetétől (BBCH 61) szüret előtti állapotig (BBCH 87)
szőlő (bor)	botritiszes betegség (szürkepenész)	3	10	0,75-1,0	600-1000	virágzás kezdetétől (BBCH 61) zsendülésig (BBCH 85)
szamóca, málna	botritiszes betegség (szürkepenész)	3	7	1,0	500-600	virágzás kezdetétől (BBCH 61) betakarítás előtti állapotig (BBCH 87)
kajszi	monília terméshadadás, monília virág- és hajtáspusztulás	3	7	1,0	600-1200	szíromlabda állapottól (BBCH 59) érésig (BBCH 89)
cseresznye, meggy	monília terméshadadás, monília virág- és hajtáspusztulás	3	10	1,0	600-1200	fehérbimbós állapot kezdetétől (BBCH 57) érésig (BBCH 89)
őszibarack	monília terméshadadás, monília virág- és hajtáspusztulás	3	7	1,0	600-1200	virágzás kezdetétől (BBCH 57) érésig (BBCH 89)
szilva	monília terméshadadás, monília virág- és hajtáspusztulás	3	12	1,0	600-1200	szíromlabda állapottól (BBCH 59) érésig (BBCH 89)
paradicsom szabadföldi és hajtattott	botritiszes betegség (szürkepenész)	3	8	1,0	400-1200	kétleveles állapottól (BBCH 12) érésig (BBCH 89)

uborka <i>hajtatott</i>	botrítisztes betegség (szürkepenész)	3	8	1,0	400-1200	kétleveles állapottól (BBCH 12) érésig (BBCH 89)
fejes saláta <i>hajtatott</i>	botrítisztes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)	3	7	1,0	400-600	háromleveles állapottól (BBCH 13) végleges fejméret kialakulásáig (BBCH 49)
Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.						
batávia saláta, jégсалáta, lollo saláta, római saláta, tépősaláta <i>hajtatott</i>	botrítisztes betegség (szürkepenész), szklerotíniás betegség (fehérpenész)	3	7	1,0	400-600	háromleveles állapottól (BBCH 13) végleges fejméret kialakulásáig (BBCH 49)

Előírt növényvédelmi technológia:

Szőlőben (bor és csemege) a *botrítisztes betegség (szürkepenész)* elleni védekezést megelőző jelleggel javasolt elvégezni közvetlenül a fűtőzáródást megelőző időszakban, illetve a zsendülés állapotában. A hatóanyag a spórák csírázását és a gombafonalak növekedését egyaránt gátolja. Járványhelyzetben a nagyobb területi dózis alkalmazása indokolt.

Bogyósokban (szamóca, málna) a *botrítisztes betegség (szürkepenész)* ellen megelőző jelleggel javasolt védekezni a virágzás és a termésnövekedés időszakában. A fertőzéshez kedvező feltételek mellett a kezeléseket 20%-os virágnyíláskor, teljes virágzáskor és 80%-os elvirágzáskor kell végrehajtani.

Csonthéjas kultúrákban (cseresznye, meggy, őszibarack, kajszli és szilva) a *moniliás virág- és hajtáspusztulás* ellen a védekezést bimbós állapot végén, virágzás kezdetén javasolt elkezdni. Járványveszélyes időszakban a kezelést a virágzás időszakában indokolt megismételni. A *moniliás termésrothadás* elleni védekezésre a készítmény a termésérés előtti időszakban használható.

Uborka (hajtatott) és **paradicsom** (szabadföldi és hajtatott) **kultúrákban** a *botrítisztes betegség (szürkepenész)* ellen az első tünetek észlelésekor, illetve a sebzést kiváltó fitotechnikai műveletek után indokolt védekezni.

Hajtatott fejes salátában és fejes salátafélékben (batávia saláta, jégсалáta, lollo saláta, római saláta, tépősaláta) a *botrítisztes betegség (szürkepenész)* és a *szklerotíniás betegség (fehérpenész)* ellen a védekezést már a palántaneveléskor szükséges megkezdeni. A kezelést a palánták kiültetését követően közvetlenül, majd 1-2 hét múlva indokolt megismételni. A kezeléseket során törekedni kell a fertőzésre fogékony gyökérnyaki rész és az alsó levelek fonákának megfelelő permetlé fedésére.

A készítmény egymást követő alkalmazását kerülni kell. Két kezelés közötti védekezésre más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó készítményt szükséges felhasználni. A *botrítisztes betegség (szürkepenész)* elleni legalább három permetezést igénylő védekezési programban a **készítménnyel önállóan végzett permetezések száma nem lehet több a betegség ellen végrehajtott összes kezelésszám harmadánál.** (3 kezelésből 1, 6 kezelésből legfeljebb 2).

A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Hatásmechanizmus

A **fenhexamid** szterol bioszintézis gátló hatóanyag (FRAC kód 17).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD ₅₀ értéke (patkányon):	>2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	közepesen veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség toxicitás alapján*:	nem jelölésköteles
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:	nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:



Figyelmeztetés: -

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:

H411 Méregző a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

* Címkén nem feltüntetendő adat

Kiegészítő veszélyességi információ:

- EUH208** Benzizotiazolt (CAS szám: 2634-33-5) és izotiazolok (CAS szám: 55965-84-9) keverékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
- EUH401** Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges P-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **10 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
Borszőlő	14
Csemeszőlő	14
Szamóca	3
Málna	7
Cseresznye, meggy	3
Őszibarack, kajszis és szilva	3
Uborka (hajtatott)	1
Paradicsom (hajtatott, szabadföldi)	3
fejes saláta, batávia saláta, jégsaláta, lollo saláta, római saláta, tépősaláta (hajtatott)	3

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

- 5.5.1.1. Előkészítőknak: védőkesztyű, védőruha
- 5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszерelés, csomagolás:

- 6.1. Kiszерelés térfogata/tömege: 10 ml; 100ml; 1 liter, 200 liter, 1000 liter
- 6.2. Csomagolószer anyaga: HDPE

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 2 évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

8. Forgalmazási kategória:

- 10 ml; 100 ml: **III.**
- 1 liter, 200 liter, 1000 liter: **II.**

Budapest, 2025. november 24.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.